

# TMG 2383

## IPRO

### CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



Grupo de  
Maturação  
**8.3**



Hábito de  
Crescimento  
**Semi determinado**



Flor  
**Branca**



Pubescência  
**Cinza**



Hilo  
**Marrom Claro**



Acamamento  
**Resistente**

### REAÇÃO A DOENÇAS



Mancha-alvo  
**SI**



Pústula Bacteriana  
**R**



Crestamento Bacteriano  
**SI**



Mancha Olho de Rã  
**S**



Oídio  
**SI**



DFC (Campo)  
**SI**

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE  
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

## TMG

Alto teto produtivo, Ampla adaptabilidade, Resistência a nematóide de cisto raças 1 e 3.

### COMPORTAMENTO A NEMATOIDES



Nematóide  
de Galha (M. incognita)

**S**



Nematóide  
de Galha (M. javanica)

**S**



Nematóide  
de Cisto

**R RAÇAS 1 E 3**

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE  
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

### POSICIONAMENTO DA CULTIVAR



Exigência  
em Fertilidade

**MÉDIA/ALTA**



Época Preferencial  
de Semeadura

**01/10 - 15/11**

### CICLO MÉDIO EM DIAS - POPULAÇÃO/HA (X 1000)

MS (Norte)	128	220 - 260
MT (Sul)	124	260 - 330
MT (Médio Norte)	115	260 - 330
MT (V. Araguaia)	115	250 - 330
MT (Parecis)	115	260 - 330
RO até 400m alt.	116	200 - 260

