

M8372IPRO



Resistência a nematóide de cisto raças 1, 3, 6 e 10 / possibilita 2ª safra / alto potencial produtivo e ampla adaptabilidade.

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



Grupo de Maturação
8.3



Hábito de Crescimento
Determinado



Flor
Branca



Pubescência
Marrom



Hilo
Marrom



Acamamento
Resistente

REAÇÃO A DOENÇAS



Mancha-alvo
MR



Pústula Bacteriana
R



Crestamento Bacteriano
MR



Mancha Olho de Rã
MR



Oídio
SI



DFC (Campo)
MS

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

COMPORTAMENTO A NEMATOIDES



Nematoide de Galha (M. incognita)

S



Nematoide de Galha (M. javanica)

S



Nematoide de Cisto

R (1,3) E MR (6,10)

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

POSICIONAMENTO DA CULTIVAR



Exigência em Fertilidade

MÉDIA/ALTA



Época Preferencial de Semeadura

05/10 - 15/11

CICLO MÉDIO EM DIAS - POPULAÇÃO/HA (X 1000)

MS (Norte)	125 - 127	200 - 220
MT (Sul)	120 - 125	260
MT (Médio Norte)	115 - 120	240
MT (V. Araguaia)	115 - 120	240
MT (Parecis)	115 - 120	240
RO até 400m alt.	116	200 - 240

