

# ATAQUE

811X82RSF I2X

# I2X

## CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



Grupo de  
Maturação  
**8.1**



Hábito de  
Crescimento  
**Indeterminado**



Flor  
**Branca**



Pubescência  
**Marrom**



Hilo  
**Preto Escuro**



Acamamento  
**MR**

## REAÇÃO A DOENÇAS



Mancha-alvo  
**SI**



Pústula Bacteriana  
**R**



Crestamento Bacteriano  
**SI**



Mancha Olho de Rã  
**S**



Oídio  
**SI**



DFC (Campo)  
**SI**

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE  
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

Alto potencial produtivo / resistência a nematóide de cisto raças R3 MR 6, 9, 10, 14

## COMPORTAMENTO A NEMATOIDES



Nematóide  
de Galha (M. incognita)

**S**



Nematóide  
de Galha (M. javanica)

**S**



Nematóide  
de Cisto

**R3 MR 6, 9, 10, 14**

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE  
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

## POSICIONAMENTO DA CULTIVAR



Exigência  
em Fertilidade

**ALTA**



Época Preferencial  
de Semeadura

**05/10 - 20/11**

## CICLO MÉDIO EM DIAS - POPULAÇÃO/HA (X 1000)

MS (Norte)	125	250 - 320
MT (Sul)	123	250 - 320
MT (Médio Norte)	111	280 - 350
MT (V. Araguaia)	117	280 - 350
MT (Parecis)	111	280 - 350
RO até 400m alt.	112	200 - 280

