

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



Grupo de
Maturação
7.4



Hábito de
Crescimento
Indeterminado



Flor
Branca



Pubescência
Cinza



Hilo
Marrom Claro



Acamamento
Resistente

REAÇÃO A DOENÇAS



Mancha-alvo
MR



Pústula Bacteriana
MR



Crestamento Bacteriano
MR



Mancha Olho de Rã
MR



Oídio
SI



DFC (Campo)
SI

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

Precoce (permite 2ª safra) / alto potencial produtivo e
ampla adaptabilidade / alta tolerância ao acamamento.

COMPORTAMENTO A NEMATOIDES



Nematóide
de Galha (M. incognita)

S



Nematóide
de Galha (M. javanica)

S



Nematóide
de Cisto

S

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

POSICIONAMENTO DA CULTIVAR



Exigência
em Fertilidade

ALTA



Época Preferencial
de Semeadura

10/10 - 25/11

CICLO MÉDIO EM DIAS - POPULAÇÃO/HA (X 1000)

MS (Norte)	102	350 - 450
MT (Sul)	113	350 - 450
MT (Médio Norte)	102	350 - 400
MT (V. Araguaia)	105	350 - 400
MT (Parecis)	102	350 - 400
RO até 400m alt.	106	300 - 350

