

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



Grupo de
Maturação
7.4



Hábito de
Crescimento
Indeterminado



Flor
Branca



Pubescência
Cinza



Hilo
Marrom Claro



Acamamento
Resistente

REAÇÃO A DOENÇAS



Mancha-alvo
MS



Pústula Bacteriana
S



Crestamento Bacteriano
SI



Mancha Olho de Rã
S



Oídio
SI



DFC (Campo)
SI

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

Resistência a nematóide de cisto raças 3, 6, 10, 14, 14+
e mr 9 / alto potencial produtivo

COMPORTAMENTO A NEMATOIDES



Nematoide
de Galha (M. incognita)

S



Nematoide
de Galha (M. javanica)

MR



Nematoide
de Cisto

**R (3,6,10,14,
14+) E MR (9)**

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

POSICIONAMENTO DA CULTIVAR



Exigência
em Fertilidade

ALTA



Época Preferencial
de Semeadura

10/10 - 15/11

CICLO MÉDIO EM DIAS - POPULAÇÃO/HA (X 1000)

MS (Norte)	99	350 - 400
MT (Sul)	109	350 - 400
MT (Médio Norte)	98	350 - 400
MT (V. Araguaia)	103	350 - 400
MT (Parecis)	100	350 - 400
RO até 400m alt.	103	300 - 350

