

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



Grupo de
Maturação
7.2



Hábito de
Crescimento
Indeterminado



Flor
Roxa



Pubescência
Cinza



Hilo
Marrom Claro



Acamamento
MR

REAÇÃO A DOENÇAS



Mancha-alvo
SI



Pústula Bacteriana
R



Crestamento Bacteriano
SI



Mancha Olho de Rã
S



Oídio
SI



DFC (Campo)
SI

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

Alto potencial produtivo / estabilidade / resistência a nematóide de cisto raças 3 e 14, e mr raças 6,9,10 e 14+.

COMPORTAMENTO A NEMATOIDES



Nematóide
de Galha (M. incognita)

S



Nematóide
de Galha (M. javanica)

MR



Nematóide
de Cisto

**R RAÇA 3 E 14,
MR RAÇA 6,9,10 E 14+**

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

POSICIONAMENTO DA CULTIVAR



Exigência
em Fertilidade

ALTA



Época Preferencial
de Semeadura

10/10 - 25/11

CICLO MÉDIO EM DIAS - POPULAÇÃO/HA (X 1000)

MS (Norte)	SI	SI
MT (Sul)	101	350 - 400
MT (Médio Norte)	93	350 - 400
MT (V. Araguaia)	96	350 - 400
MT (Parecis)	97	350 - 400
RO até 400m alt.	96	280 - 350

