

CARACTERÍSTICAS AGRONÔMICAS



Grupo de
Maturação
7.7



Hábito de
Crescimento
Indeterminado



Flor
Roxa



Pubescência
Cinza



Hilo
Preto Imperfeito



Acamamento
MR

REAÇÃO A DOENÇAS



Mancha-alvo
SI



Pústula Bacteriana
R



Crestamento Bacteriano
SI



Mancha Olho de Rã
S



Oídio
SI



DFC (Campo)
SI

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

Alto potencial produtivo / resistência a nematóide de cisto raça 3 e mr raças 9, 10, 14 e 14+.

COMPORTAMENTO A NEMATOIDES



Nematoide
de Galha (M. incognita)

S



Nematoide
de Galha (M. javanica)

S



Nematoide
de Cisto

R (3)
MR (9,10,14,14+)

R - RESISTENTE | S - SUSCETÍVEL | MR - MODERADAMENTE RESISTENTE
MS - MODERADAMENTE SUSCETÍVEL | SI - SEM INFORMAÇÃO

POSICIONAMENTO DA CULTIVAR



Exigência
em Fertilidade

ALTA



Época Preferencial
de Semeadura

05/10 - 25/11

CICLO MÉDIO EM DIAS - POPULAÇÃO/HA (X 1000)

MS (Norte)	SI	SI
MT (Sul)	111	350 - 400
MT (Médio Norte)	98	350 - 400
MT (V. Araguaia)	100	350 - 400
MT (Parecis)	100	350 - 400
RO até 400m alt.	106	220 - 280

